

Variety sazenic

Nejdostupnější jsou sazenice prostokořenné, mají kořenový systém bez zeminy a minimálně 3 vyvinuté listy. Při jejich výsadbě je potřeba dostatečně spojit kořeny s půdou, aby dobře zakořenily. Další variantou jsou sazenice s kořenovým balem předpěstované v sadbovačích. Jejich výhodou je snadné a rychlé zakořenění.

Třetím typem je Frigo sadba, ta tvoří bohatý kořenový systém a je zbavená všech listů. Kvalitní Frigo sadba vykazuje až dvakrát vyšší počet květů v prvním roce pěstování, protože byla uchována při teplotě - 1 až -2°C a neztratila žádné zásobní látky.

3.4. Výsadba

Jahodník lze vysazovat v jakémkoli ročním období, pokud jsou sazenice způsobilé k výsadbě a umožňují tomu klimatické podmínky, což je obvykle od poloviny července do konce září. Některý rok i do konce října. Pro jarní období platí nejpozdější termín do 15. dubna, je-li požadavek dobré sklizně v témže roce. Jahodník vysazený v červenci vykazuje v následujícím roce o 90% vyšší úrodu v porovnání se srpnovou výsadbou.

Správně se vysazuje do vlhké půdy za podmračeného počasí, nebo ve večerních hodinách, do jamek vytvořených sázecí lopatkou, nikoli sázecím kolíkem, který půdu utlačuje a omezuje prorůstání kořenů. Sazenice vložena do jamky tak, aby kořenový krček byl v úrovni půdy a přitlačení půdy ke kořenům je zásadou. Správné vysazení lze vyzkoušet slabým potáhnutím sazenice z půdy, ta by měla pevně držet.

Nejméně jeden týden po vysazení je třeba udržovat dostatečnou půdní vlhkost nejlépe vydatnou závlahou, aby se voda dostala do hloubky. Přihnojení anorganickými hnojivy během 14 dní po výsadbě je nevhodné, protože by se mladé kořínky hnojivem mohly poškodit. Zakořeňování podporuje půda bohatá na vzduch, vlhkost a bez čerstvého hnojiva nebo humusu. Dva týdny po výsadbě je dobré poprvé doplnit hnojivo NPK v dávce 15 g/m².